

# Se protéger et protéger sa famille de la **PESTE**

- ▶ Se rendre impérativement et immédiatement au centre de santé (CSB) en cas de **signes suspects** ou dès l'apparition de **signes douteux**
- ▶ Le **traitement contre la Peste existe** et est **très efficace**
- ▶ Le traitement **est gratuit** au niveau des formations sanitaires (CSB)



# Important à SAVOIR


- ▶ L'épidémie de peste est une maladie qui peut toucher **tout le monde** en tout lieu. Elle est **mortelle** si elle n'est pas traitée à temps au niveau des formations sanitaires. Un cas constitue une épidémie dans une zone où la peste n'existe pas
- ▶ Le **diagnostic** de la peste **se fait seulement** au niveau des **formations sanitaires (Centre de santé de base - CSB)** pour éviter la confusion avec d'autres maladies
- ▶ Les médicaments anti-pestueux **n'ont pas d'effets secondaires** et sont **gratuits** au niveau des formations sanitaires (CSB). Les malades bien soignés guérissent sans problème
- ▶ L'automédication est **dangereuse**, car elle peut créer une résistance aux antibiotiques et empêcher l'efficacité d'un traitement médicamenteux
- ▶ Les deux principales formes de peste sont : la **peste bubonique** qui se transmet par la pique d'une **puce infectée** et la **peste pulmonaire** qui se transmet par le **contact avec une personne** malade de la peste
- ▶ Toute personne ayant été en contact étroit (moins de 2 mètres) avec un malade de peste pulmonaire est appelée «**contact**» et doit aussi **être protégée** par une médication appropriée
- ▶ Un malade de peste pulmonaire qui a commencé le traitement antibiotique **correct** cesse d'être contagieux à partir du **3<sup>ème</sup> jour de traitement**

## Peste bubonique



### Signes cliniques de peste bubonique

grosseur douloureuse au niveau d'une aire ganglionnaire (cou, aisselle, racine de la cuisse) et sans plaies, accompagnée de fièvre



La Peste Bubonique est **transmise** par le **rat malade** de la peste via la pique d'une **puce infectée**

## Peste pulmonaire



### Signes cliniques de peste pulmonaire

forte toux, crachat sanguinolent, forte fièvre, douleur au niveau du thorax, difficulté à respirer



La Peste Pulmonaire est **transmise** par **inhalation** des particules émanant du malade (d'homme à homme)

# Les mesures de PREVENTION

- ▶ Maintenir les milieux d'habitations **sains** et **propres** pour éliminer rats et puces: débroussaillage, nettoyage régulier, désinsectisation, gestion et traitement adaptés des ordures ménagères
  - ▶ **Laver** régulièrement vos mains avec de l'eau et du savon
  - ▶ **Désinsectiser** la maison et les alentours de la maison. Une fois les alentours désinsectisés
  - ▶ **Garder** la maison et ses alentours **propres**, ne pas jeter les débris partout mais uniquement dans les **poubelles appropriées**, pour éviter la **prolifération des rats**
- .....
- ▶ **Eviter** les endroits **fermés** et **sans aération**, éviter également les endroits confinés contenant beaucoup de monde
  - ▶ **Eviter** d'entrer dans des maisons récemment abandonnées
  - ▶ **Suspendre** certains rites funéraires lorsqu'il s'agit d'une personne **décédée de la peste**, pour limiter la contamination et / ou propagation de la bactérie
  - ▶ **Eviter** de manipuler des cadavres de rats et d'humains
  - ▶ **Se protéger** contre les piqûres de puces
  - ▶ **Eviter** d'être en contact avec un **malade suspect**
  - ▶ **Eviter** de **cracher** partout

# Les mesures de TRAITEMENT

- ▶ Se rendre impérativement et immédiatement au centre de Santé (CSB) en cas de **signes suspects** ou dès l'apparition de **signes douteux** tel que de fortes fièvres, des grosseurs douloureuses au niveau des ganglions, des toux, et des crachats sanguinolents, des douleurs thoraciques
- ▶ Les centres de santé (CSB) ont les **capacités** et les **ressources nécessaires** pour traiter **gratuitement** la **Peste**. Le **traitement existe** et est **très efficace**.
- ▶ Après un déplacement dans une **zone endémique**, en particulier au cours d'une épidémie déclarée, consulter immédiatement le centre de santé ou tout autre professionnel de santé si présence d'un ou plusieurs symptômes évocateurs de la maladie
- ▶ **Informé** les autorités en cas de maladies ou décès suspects
- ▶ Référer les **malades suspects** de peste au niveau des formations sanitaires (CSB)





En cas de doute, pour plus d'informations:  
appelez **GRATUITEMENT**

 **034 30 810 30**  **033 65 800 00**  **032 32 038 00**